


ПАМЯТКА ПО ПОДГОТОВКЕ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ)



Уважаемый пациент!

Вам назначили КТ-исследование. Для того чтобы оно было максимально информативным, перед его проведением просим Вас соблюдать простые правила.

ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ

- Исследование желательно проводить натощак. Просим Вас отказаться от пищи за 4-6 часов, жидкости за 2 часа до КТ желудочно-кишечного тракта и КТ с контрастированием.
- За сутки до исследования желудочно-кишечного тракта желательно ограничить продукты, способствующие повышенному газообразованию (бобовые, капуста, газированные напитки, большое количество сырых овощей и фруктов).
- Для выполнения КТ с контрастированием обязателен анализ на креатинин для подсчета СКФ (скорость клубочковой фильтрации). Анализ действителен до 90 дней для плановых пациентов без факторов риска. Для пациентов с факторами риска анализ действителен 30 дней. Для острых/тяжелых пациентов — 7 дней. Потенциальные риски включают в себя: заболевания почек (СКФ менее 60 мл/мин/1.73 м²), операции на почках, белок в моче, артериальная гипертензия, повышение мочевой кислоты в моче, сахарный диабет.
- При наличии у Вас хронической почечной недостаточности (ХПН) со снижением СКФ менее 30 мл/мин/1.73 м², реакции на йодсодержащий контраст, гипертиреоза и крупного многоузлового зоба, возраста до 3 лет, а также беременности исследование выполняется только с разрешения врача и по жизненно важным показаниям.
- С осторожностью контраст применяется при наличии у Вас ХПН со снижением СКФ от 30 до 59 мл/мин/1.73 м², сахарном диабете, феохромоцитоме, бронхиальной астме, отягощенном анамнезе. В этих случаях может потребоваться премедикация, консультации аллерголога и нефролога до записи на КТ с контрастированием.

У пациентов с СКФ до 44 мл/мин/1.73 м² принимающих Метформин (другие бигуаниды) необходимо отменить препарат за 48 часов до и после введения контраста.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Перед проведением КТ Вас попросят снять украшения и одежду с металлическими включениями.
- Перед началом исследования Вам установят внутривенный катетер, чтобы в процессе можно было ввести контрастное вещество. После введения контрастного вещества Вы можете почувствовать тепло по телу и металлический привкус во рту. Это нормальная реакция организма.
Если во время проведения исследования Вы почувствуете зуд, заложенность носа, першение в горле, немедленно сообщите об этом лаборанту.
- При исследовании с пероральным контрастированием и КТ-энтерографии необходимо подойти за 40-60 минут до исследования для того, чтобы выпить раствор контрастного вещества.
- В зависимости от области обследования, длительность исследования может быть от 15 до 60 минут.
- При выполнении некоторых исследований Вас попросят несколько раз задержать дыхание на 10-15 секунд.
- После проведения КТ Вы получите диск с записью исследования. Заключение КТ готовится врачом-рентгенологом от 2-х до 24-х часов и будет доступно в Вашем личном кабинете на сайте, также его можно получить в регистратуре любой из наших поликлиник.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, позвоните: +7(495)780-0771